



JAK SE OČKUJE

Základní očkovací schéma – pro chladné měsíce



Zkrácené očkovací schéma – pro teplé měsíce



**UPOZORNÍME VÁS NA DALŠÍ DÁVKU.
ZAREGISTRUJTE SE NA
WWW.POZORKLISTE.CZ**

NYNÍ PŘÍSPÍVÁ KAŽDÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA!

INFORMUJTE SE O AKTUÁLNÍ VÝŠI PŘÍSPĚVKU U VAŠÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Kód	Pojišťovna	Infolinka
111	VZP	844 117 777
201	VOZP	222 929 199
207	OZP	261 105 555
217	ZPMA	844 125 124
211	ZPMV	844 121 121
213	RBP	800 213 213
205	CPP	810 800 000
209	ZPS	800 209 000

www.pozorkliste.cz

**PRO VÍCE INFORMACÍ O NEMOCI
A OČKOVÁNÍ VOLEJTE
NA BEZPLATNOU LINKU**

800 202 010
(Po–Pá 9–17 hod.)

BAXTER CZECH spol. s r. o.

Karla Engliše 3201/6, Praha 5, 150 00
tel.: +420 225 774 111
fax: +420 225 774 250

Klíšťová encefalitida se týká i vás!



**Myslete taky na sebe.
Nechte očkovat nejen své
děti, ale i sebe.**

**Získejte nyní příspěvek na
očkování u vaší pojišťovny!**

www.pozorkliste.cz

Baxter

NAKAŽENÁ KLÍŠTATA SE VYSKYTUJÍ TĚMĚŘ PO CELÉ ČR



Interní zdroj Baxter vydaný v roce 2010.

- oblasti s vysokým výskytem onemocnění KE
- jednotlivé případy výskytu onemocnění KE

Klíště můžete chytnout i na zahrádce nebo při procházce v městském parku.

Nakažené klíště může způsobit klíšťovou encefalitidu, onemocnění se závažným průběhem i následky.

Klíšťovou encefalitidou se můžete nakazit:

- při rekreačních aktivitách v přírodě
- procházkách v parku
- sportování (cyklistika, běhání, in-line brusle a další)
- venčení psa nebo odstraňování klíštěte z jeho srsti
- sběru hub a lesních plodů
- zahradničení atp.

PROJEVY ONEMOCNĚNÍ KLÍŠŤOVOU ENCEFALITIDOU¹

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění mozku a mozkových plen. Ačkoli většina nálezů probíhá asymptomaticky, může infekce v některých případech vyústit v závažné onemocnění - klíšťovou encefalitidu. Virus se nejčastěji přenáší přisátím nakaženého klíštěte. Onemocnění má obvykle dvoufázový průběh.

První fáze připomíná lehkou chřipku (zvýšená teplota, únava, bolesti hlavy, svalů a kloubů).

V druhé fázi nemoci se pacientovi přitíží – to již virus pronikl do mozku. Mohou nastoupit silné bolesti hlavy provázené horečkou. Nemocný je světloplachý, přidává se nevolnost a zvracení. Příznakem poškození nervového systému je ztuhnutí svalů na šíji, nervové obrny, závratě, poruchy spánku, paměti, dezorientace a porucha vědomí. Pacient musí být hospitalizován a teprve poté obvykle dojde k postupnému zlepšování stavu. Nemocný může někdy i po vyléčení trpět bolestmi hlavy nebo dokonce částečnou obrnou.

Jak onemocnění, tak i jeho následky mají u dospělých většinou těžší průběh než u dětí. Závažnost nemoci u starších osob se projevuje vyšším počtem obtíží během akutní nemoci a vyšším počtem dnů strávených v lékařské péči. Může dojít k výskytu obrny a dlouhodobých následků, které mohou způsobit dlouhou pracovní neschopnost a tím zhoršit kvalitu života člověka.

Více informací najdete na
www.pozorkliste.cz
www.klistova-encefalitida.cz

¹ převzato z Lindquist L, Vapalahti O. Tick-borne encephalitis. Lancet 2008; 371: 1861–71

ÚČINNOU OCHRANOU PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ JE OČKOVÁNÍ

Lékaři dovedou částečně léčit příznaky této nemoci, nikoli však její příčinu.

KDE SE NECHAT OČKOVAT

- u svého praktického lékaře
- děti u praktického lékaře pro děti a dorost
- v očkovacím centru (seznam najdete na www.pozorkliste.cz)

O VAKCÍNÁCH

- vakcíny proti klíšťové encefalitidě jsou prověřené více než 20letou praxí*
- nazývají se FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER (pro dospělé od 16 let) a FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER (pro děti od 1 roku do 16 let)
- vakcíny FSME-IMMUN jsou v České republice nejprodávanějšími vakcínami proti klíšťové encefalitidě**
- základní očkovací schéma tvoří 3 dávky
- cena jedné dávky je cca 600 Kč

Léčivá látka:
Virus encephalitis
inactivatum purificatum

Vakcíny proti klíšťové
encefalitidě



*vakcína FSME-IMMUN 0,5 ml BAXTER je na trhu v ČR od roku 1991
**zdroj: výpočet proveden z prodejní databáze IMS dat na základě prodeje vakcín proti klíšťové encefalitidě v roce 2011

Baxter